



# Invulformulier voor de nazorg 2012

## Baarderadeel

<b>Vul in de gegevens van uw wacht en rayon en het aantal geraapte eieren:</b>				
<b>Vogelwacht:</b>	<b>nr.</b>			
<b>Naam rayon:</b>	<b>nr.</b>			
<b>Naam rayoncoördinator:</b>	<b>tel.nr.:</b>			
	<b>Grasland</b>	<b>Maïsland</b>	<b>Akkerland</b>	<b>Totaal:</b>
<b>Oppervlakte:</b>	.....	+ .....	+ .....	= ..... hectare
<b>Namen van <u>alle</u> betrokken nazorgers en (let op, dit is een ons opgelegde plicht !!) het aantal geraapte eieren per nazorger, ten tijde van de eierzoekestijd:</b>				
<b>Naam:</b>		<b>Geraapte eieren in de eierzoekestijd:</b>	<b>X</b>	<b>eieren</b>
<b>Naam:</b>		“	: X	eieren
<b>Naam:</b>		“	: ...	eieren
<b>Naam:</b> .....	.....	“	: ...	eieren
<b>Naam:</b> .....	.....	“	: ...	eieren
<b>Naam:</b> .....	.....	“	: ...	eieren
				----- +
<b>Totaal geraapt door uw nazorgers:</b>				... eieren
-----				
<b>Van de nazorgers van dit rayon zijn:</b>				
..... personen ook “aaisiker” en ..... zijn personen niet “aaisiker”				

### Algemene suggesties

- Gebruikmaking van het “Fjildboekje” vergemakkelijkt het invullen. Dit kunt U krijgen!
- Gebruik een topografische kaart van het gebied; teken de nesten in en geef regelmatig een bijgewerkte copie aan de boer.
- Bij de gegevens over predatie: raadpleeg uw predatiefolder! Deze hebt U, zo niet, vraag hem op! Probeer de juiste verliesoorzaak te vinden.
- De instructie voor de nazorg hebt U ook, volg deze!
- Tips, suggesties altijd welkom op Bondsbureau BFVW, email: info@bfvw.nl

**De coördinator van dit rayon vult alle gevraagde informatie in en levert het vóór 1 augustus 2012 bij de coördinator van de wacht in.**

## Hoofdsoorten Kievit, grutto, tureluur en scholekster

### Nesten

1a

nesten		kievit	grutto	tureluur	scholekster	toelichting
aantal gevonden op	grasland					<b>let op:</b> per paar kunnen dus meer nesten tellen!
	maïsland					
	akkerland					
totaal gevonden						
uitgekomen						Controleer het nest!
verloren gegaan						is het totaal van tabel 3
resultaat onbekend						het is niet duidelijk of het nest uitkwam of niet

### Broedparen

1b

broedparen		kievit	grutto	tureluur	scholekster	
getelde broedparen op	grasland					aantal geteld op  doortrekkers niet tellen
	maïsland					
	akkerland					
totaal aantal broedparen						

### Paren met jongen en late legfels

1c

	kievit	grutto	tureluur	scholekster	toelichting
aantal paren met jongen van 2 tot 3 weken oud					hoeveel alarmerende paren met grotere jongen (minstens 2 weken oud) telde u, nadat het 'grote landwerk', bv. kuilen, klaar was (meestal tussen 20 mei en 1 juni)
aantal nesten na 20 mei gevonden					

## Beschermingshandelingen en de resultaten daarvan

2

beschermingshandeling	Kie- vit	grutto	ture- luur	schol- ekster	toelichting
aantal nestbeschermers geplaatst					<p>deze tabel <b>móet</b> ingevuld worden!</p> <p><b>voorbeeld beschermingshandeling:</b> stokken plaatsen bij een gruttonest telt pas als beschermingshandeling, indien de boer dóór die stokken om het nest maait. Als de boer pas na het uitkomen maait, is het dus geen beschermingshandeling!</p> <p><b>succesvol betekent:</b> bij deze handeling is het nest gespaard gebleven, dus bij het vb: de grutto broedt nog!</p> <p><b>let op:</b> één nest kan meerdere beschermingshandelingen ondergaan en telt dan vaker!</p>
succesvol					
aantal nesten beschermd bij maaien/kuilen					
succesvol					
aantal nesten beschermd bij werk op bouw-/maïslaan					
succesvol					
aantal nesten beschermd bij bemesten of ander werk					
succesvol					
aantal niet beschermde nesten					tel de nesten die geen beschermingshandeling ondergingen.

## Aantallen nesten die verloren gingen

3

oorzaak	kievit	grutto	ture- luur	schol- ekster	toelichting
<b>predatie:</b>					
zwarte kraai					<p><b>vossenformulier is vervallen !</b> <b>belangrijke vosse-info noteren in tabel 5</b></p> <p>namelijk..... vul in</p>
meeuw, ekster, kauw					
vos					
bunzing/wezel/hermelijn/marters					
overige predatoren, nl (buizerd, br.kiekendief)					
onbekende predatoren					
<b>agrarische werkzaamheden:</b>					
vee weiden					
maaien/kuilen					
maïs-/akkerlandbewerking					
bemesten of ander werk boer					
<b>overig:</b>					
overige oorzaken					
onbekende oorzaken					
<b>totaal verloren nesten</b>					

## Andere vogelsoorten

Alleen dié paren tellen, die –zeer waarschijnlijk- in of op de rand van het rayon hebben gebroed!

4

Soort	aantal nesten	aantal paren	Soort	aantal nesten	aantal paren	Soort	aantal nesten	aantal paren
<b>Eenden</b>			<b>Overige steltlopers</b>			<b>Overige soorten</b>		
Bergeend			Kemphaan			Knobbelzwaan		
Eidereend			Kluut			Kokmeeuw		
Krakeend			Watersnip			Visdief		
Kuifeend			Wulp			Zilvermeeuw		
Slobeend			....			Zwarte Stern		
Tafeleend						....		
Wilde eend								
Wintertaling								
Zomertaling								
<b>Zangvogels</b>			<b>Patrijzen/Rallen</b>			<b>Roofvogels</b>		
Gele Kwikstaart			Fazant			Buizerd		
Graspieper			Fuut			Kiekendief		
Veldleeuwerik			Kwartelkoning			Ekster		
Witte Kwikstaart			Meerkoet			Roek		
....			Patrijs			Torenvalk		
			Waterhoen			Zwarte Kraai		
			....					

5

Bijzondere waarnemingen, merkwaardige voorvallen of wat u verder maar kwijt wil:

De coördinator van de wacht levert de gegevens per rayon, via de computer, vóór 1 augustus aan!

Lever de telgegevens inclusief stippenkaart uiterlijk 1 augustus bij de gebiedscoördinator Baarderadeel!

**Hoofdsoorten**

Kievit	Ki
Grutto	Gr
Tureluur	Tu
Scholekster	Sc

**Eenden**

Bergeend	BE
Eidereend	EE
Krakeend	KrE
Kuifeend	KE
Slobeend	SE
Tafeleend	TE
Wilde eend	WE
Wintertaling	WT
Zomertaling	ZT

**Overige Steltlopers**

Kemphaan	KH
Kluut	KI
Watersnip	WS
Wulp	Wu

**Overige soorten**

Knobbelzwaan	KnZ
Kokmeeuw	KoM
Visdief	VD
Zilvermeeuw	ZiM
Zwarte Stern	ZSt

**Zangvogels**

Gele kwikstaart	GKw
Graspieper	GP
Veldleeuwerik	VL
Witte Kwikstaart	WKw

**Patrijzen/Rallen**

Fazant	Fa
Fuut	Fu
Kwartelkoning	KwK
Meerkoet	MK
Patrijs	Pa
Waterhoen	WH

**Roofvogels**

Blauwe kiekendief	BlK
Bruine kiekendief	BrK
Buizerd	Bui
Ekster	E
Grauwe kiekendief	GrK

Zwarte Kraai	ZKr
Kauw	Ka